



MINISTERUL MEDIULUI



**Agenția Națională pentru Protecția Mediului  
Agenția pentru Protecția Mediului Cluj**

Nr. 23648, 11.12.2018

Se aprobă,  
p. Director executiv  
Dr. Ing. Liana MUREŞAN

*Liana Mureșan*



**RAPORT PRIVIND  
STAREA MEDIULUI  
ÎN JUDEȚUL CLUJ  
AUGUST 2018**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca

E-mail: [office@apmcj.anpm.ro](mailto:office@apmcj.anpm.ro); Tel. 0264.410.722; Fax. 0264.410.716

# **CUPRINS**

1. Calitatea aerului
  - 1.1. Rețeaua manuală de monitorizare
  - 1.2. Rețeaua automată de monitorizare
  - 1.3. Evoluția calității aerului
2. Calitatea solului
3. Radioactivitatea mediului
4. Nivelul de zgomot
5. Poluări accidentale
6. Surse de poluare



# 1.CALITATEA AERULUI

## 1.1. Rețeaua manuală de monitorizare

Calitatea aerului din județul Cluj este urmărită prin determinări de scurtă durată (30 minute) a poluanților gazoși: amoniacul ( $\text{NH}_3$ ), dioxidul de azot ( $\text{NO}_2$ ) și dioxidul de sulf ( $\text{SO}_2$ ) și determinări de pulberi sedimentabile.

În luna august 2018 poluanții gazoși ( $\text{NH}_3$ ,  $\text{NO}_2$  și  $\text{SO}_2$ ) au fost monitorizați în județ în localitățile Turda, Câmpia-Turzii, Gherla și Huedin.

În figura 1.1.1 sunt prezentate rezultatele monitorizării amoniacului în luna august 2018.




Figura 1.1.1. Rezultatele monitorizării amoniacului

Valorile concentrației de amoniac s-au situat sub concentrația maximă admisă ( $0,30\text{mg}/\text{m}^3$ ), conform STAS 12574/87, în toate punctele de monitorizare din județ.

Rezultatele monitorizării dioxidului de azot sunt prezentate în figura 1.1.2.




Figura 1.1.2. Rezultatele monitorizării dioxidului de azot



Conform datelor prezentate în figura 1.1.2, valorile concentrației de dioxid de azot s-au situat mult sub concentrația maximă admisă ( $0,30\text{mg}/\text{m}^3$ ), conform STAS 12574/87, în toate punctele de monitorizare din județ.

În figura 1.1.3. sunt prezentate rezultatele monitorizării dioxidului de sulf în luna august 2018.




Figura 1.1.3. Rezultatele monitorizării dioxidului de sulf

În figura 1.1.3. se observă faptul că valorile concentrației de dioxid de sulf s-au situat sub concentrația maxim admisă ( $0,75 \text{ mg}/\text{m}^3$ ), conform STAS 12574/87, în toate punctele de monitorizare din județ.

Indicatorul pulberi sedimentabile evidențiază cantitatea de pulberi (sedimentabile) care se depune în decursul a 30 de zile calendaristice pe o suprafață de  $1 \text{ m}^2$ , acesta fiind un indicator caracteristic pentru evidențierea poluării cu particule grele aflate în suspensie care ulterior se depun pe sol.

Concentrația maxim admisă, conform STAS 12574/1987, este  $\text{CMA} = 17 \text{ g}/\text{m}^2/\text{lună}$ , determinarea lor se face folosind metoda gravimetrică conform STAS 10195/1975.

Astfel, A.P.M. Cluj monitorizează pulberile sedimentabile din județul Cluj în localitățile: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla, Huedin și Aghireș.

În figura 1.1.4 sunt prezentate rezultatele monitorizării pulberilor sedimentabili în luna august 2018.




Figura 1.1.4. Rezultatele monitorizării pulberilor sedimentabili



Concentrațiile pulberilor sedimentabile (probe lunare) din județul Cluj, prelevate în luna august 2018, au înregistrat depășiri ale CMA 17 (g/mp/lună) în punctele de monitorizare Dej – industrie 85,45 g/mp/lună și Gherla – industrie 17,38 g/mp/lună.

## 1.2. Rețeaua automată de monitorizare

În județul Cluj monitorizarea calității aerului se efectuează cu ajutorul celor 5 stații automate de monitorizare a calității aerului care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.




Fig. nr. I.2.1. Amplasarea stațiilor de monitorizare în județ

Indicatorii monitorizați la stațiile automate de monitorizare a calității aerului diferă în funcție de tipul stației și sunt prezentați în tabelul următor:

Tabelul I.2.1. Prezentarea stațiilor automate de monitorizare a calității aerului din județul Cluj

Oraș	Adresă	Cod stație	Tip stație	Indicatori analizați
Cluj-Napoca	Str. Aurel Vlaicu (în fața blocului 5B, lângă OMV) cod poștal 400690	CJ-1	trafic	dioxid de sulf ( $\text{SO}_2$ ), oxizi de azot ( $\text{NO}_x$ ), monoxid de carbon (CO), compuși organici volatili (COV) și pulberi în suspensie ( $\text{PM}_{10}$ )
Cluj-Napoca	Str. Constanța nr.6, cod poștal 400158	CJ-2	urban	dioxid de sulf ( $\text{SO}_2$ ), oxizi de azot ( $\text{NO}_x$ ), compuși organici volatili (COV), pulberi în suspensie



Oraș	Adresă	Cod stație	Tip stație	Indicatori analizați
				(PM <sub>10</sub> ), pulberi în suspensie (PM <sub>2,5</sub> ) și parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatură, radiație solară, umiditate relativă, precipitații)
Cluj-Napoca	Bdul 1 Decembrie 1918, cod poștal 400699	CJ-3	suburban	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O <sub>3</sub> ), și pulberi în suspensie (PM <sub>10</sub> )
Cluj-Napoca	Str. Dâmboviței, cod poștal 400584	CJ-4	industrial	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NOx), ozon (O <sub>3</sub> ), pulberi în suspensie (PM <sub>10</sub> ) și parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară, precipitații)
Dej	Intersecția str. 21 Decembrie, colț cu str. Vasile Alecsandri (în fața imobilului cu nr.2)	CJ-5	urban	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O <sub>3</sub> ), compusi organici volatili (COV) și pulberi în suspensie (PM <sub>10</sub> )

- Stația automată de monitorizare a calității aerului de tip trafic evaluează influența traficului asupra calității aerului și are raza ariei de reprezentativitate de 10-100m;
- Stația automată de monitorizare a calității aerului de tip urban evaluează influența "așezărilor umane" asupra calității aerului și are raza ariei de reprezentativitate de 1-5 km;
- Stația automată de monitorizare a calității aerului de tip suburban evaluează influența "așezărilor umane" asupra calității aerului și are raza ariei de reprezentativitate de 10-15 km;
- Stația automată de monitorizare a calității aerului de tip industrial evaluează influența activităților industriale asupra calității aerului și are raza ariei de reprezentativitate de 100m – 1km.

### 1.2.1 Dioxidul de sulf SO<sub>2</sub>

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amăru, neinflamabil, cu un miros pătrunzător care irită ochii și căile respiratorii. Poate să provină din surse naturale: eruptiile vulcanice, fitoplanctonul marin, fermentația bacteriană în zonele mlăștinoase, oxidarea gazului cu conținut de sulf rezultat din descompunerea biomasei și din surse antropice (datorate activităților umane): sistemele de încălzire a populației care nu utilizează gaz metan,



centralele termoelectrice, procesele industriale (siderurgie, rafinărie, producerea acidului sulfuric), industria celulozei și hârtiei și, în masură mai mică, emisiile provenite de la motoarele diesel.

#### Efecte asupra sănătății populației:

În funcție de concentrație și perioada de expunere dioxidul de sulf are diferite efecte asupra sănătății umane. Expunerea la o concentrație mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de timp, poate provoca dificultăți respiratorii severe. Sunt afectate în special persoanele cu astm, copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice ale căilor respiratorii. Expunerea la o concentrație redusă de dioxid de sulf, pe termen lung poate avea ca efect infecții ale tractului respirator. Dioxidul de sulf poate potența efectele periculoase ale ozonului.

#### Efecte asupra plantelor:

Dioxidul de sulf afectează vizibil multe specii de plante, efectul negativ asupra structurii și țesuturilor acestora fiind sesizabil cu ochiul liber. Unele dintre cele mai sensibile plante sunt: pinul, legumele , ghindele roșii și negre, frasinul alb , lucerna , murele.

#### Efectele asupra mediului:

În atmosferă, contribuie la acidificarea precipitațiilor, cu efecte toxice asupra vegetației și solului. Creșterea concentrației de dioxid de sulf accelerează coroziunea metalelor, din cauza formării acizilor. Oxizii de sulf pot eroada: piatra , zidăria, vopselurile , fibrele, hârtia , pielea și componentele electrice.

Metoda de referință pentru măsurarea dioxidului de sulf este cea prevazută în standardul SR EN 14212 Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de sulf prin fluorescentă în ultraviolet.

În luna august 2018 concentrația de  $\text{SO}_2$  a fost determinată la toate cele cinci stații automate de monitorizare a calității aerului din județul Cluj.

Rezultatele monitorizării dioxidului de sulf în municipiile Cluj-Napoca și Dej în luna august 2018 sunt prezentate în tabelul 1.2.1.1.

Tabelul 1.2.1.1. Rezultatele monitorizării dioxidului de sulf

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic CJ-1 – str, Aurel Vlaicu	13,97	17,76	15,56
2	Stația de fond urban CJ-2 – L.T, Nicolae Bălcescu	4,43	9,63	6,33
3	Stația de fond suburban CJ-3 – cartierul Grigorescu	18,99	21,45	19,58
4	Stația de fond industrial CJ-4 – str, Dâmboviței	7,21	20,46	15,12
5	Stația de fond urban CJ-5 – municipiul Dej	5,35	8,39	7,39

Conform datelor prezentate în tabelul 1.2.1.1. valorile înregistrate la stațiile automate de monitorizare a calității aerului din județul Cluj, sunt mult sub valorile limită, Valorile medii orare înregistrate în luna august sunt mici decât valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane de  $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$  și decât pragul de alertă pentru  $\text{SO}_2$  de  $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , conform Legii 104/2011.

În figura următoare este prezentată evoluția mediilor zilnice de  $\text{SO}_2$  înregistrate în luna august 2018 la stațiile de monitorizare din Cluj-Napoca și Dej:






Figura 1.2.1.1. Evoluția mediilor zilnice de SO<sub>2</sub> în luna august 2018

Valorile medii zilnice înregistrate la stațiile automate de monitorizare a calității aerului din județul Cluj s-au situat mult sub valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane de 125 µg/m<sup>3</sup>, conform Legii 104/2011.




Figura 1.2.1.2. Evoluția mediilor orare de SO<sub>2</sub> în luna august 2018

Valorile medii orare înregistrate la stațiile automate de monitorizare a calității aerului din județul Cluj s-au situat mult sub valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane de 350 µg/m<sup>3</sup>, conform Legii 104/2011.

## 1.2.2. Oxizi de azot NOx (NO/NO<sub>2</sub>)

Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reactive, care conțin azot și oxigen în cantități variabile. Monoxidul de azot (NO) este un gaz incolor și inodor iar dioxidul de azot (NO<sub>2</sub>) este un gaz de culoare brun-roșcat cu un miros puternic, încărcios. Dioxidul de azot în combinație cu particule din aer poate forma un strat brun-roșcat. În prezența luminii solare, oxizii de azot pot reacționa și cu hidrocarburile formând oxidanți fotochimici. Oxizii de azot sunt responsabili pentru ploile acide care afectează atât suprafața terestră cât și ecosistemul acvatic.



Oxizii de azot se formează în procesul de combustie atunci când combustibili sunt arși la temperaturi înalte, dar cel mai adesea ei sunt rezultatul traficului rutier, activităților industriale, producerii energiei electrice. Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calității apei, efectului de seră, reducerea vizibilității în zonele urbane.

Efectele oxizilor de azot asupra sănătății populației:

Dioxidul de azot este cunoscut ca fiind un gaz foarte toxic atât pentru oameni cât și pentru animale (gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului de azot). Expunerea la concentrații ridicate poate fi fatală, iar la concentrații reduse afectează țesutul pulmonar. Populația expusă la acest tip de poluanți poate avea dificultăți respiratorii, iritații ale căilor respiratorii, disfuncții ale plămânilor. Expunerea pe termen lung la o concentrație redusă poate distrage țesuturile pulmonare ducând la emfizem pulmonar. Persoanele cele mai afectate de expunerea la acest poluant sunt copiii.

Efectele oxizilor de azot asupra plantelor și animalelor:

Expunerea la acest poluant produce vătămarea serioasă a vegetației prin albirea sau moartea țesuturilor plantelor, reducerea ritmului de creștere a acestora. Expunerea la oxizii de azot poate provoca boli pulmonare animalelor, care seamănă cu emfizemul pulmonal, iar expunerea la dioxidul de azot poate reduce imunitatea animalelor provocând boli precum pneumonie și gripe.

Metoda de referință pentru măsurarea dioxidului de azot și a oxizilor de azot este cea prevăzută în standardul SR EN 14211 Calitatea aerului înconjurător, Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de azot și monoxid de azot prin chemiluminescență.

Rezultatele monitorizării dioxidului de azot în municipiile Cluj-Napoca și Dej în luna august 2018 sunt prezentate în tabelul 1.2.2.1.

Tabelul 1.2.2.1. Rezultatele monitorizării dioxidului de azot

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic CJ-1 – str. Aurel Vlaicu	47,40	144,38	34,97
2	Stația de fond urban CJ-2 – L.T. Nicolae Bălcescu	*	*	*
3	Stația de fond suburban CJ-3 – cartierul Grigorescu	28,02	78,61	15,23
4	Stația de fond industrial CJ-4 – str. Dâmboviței	*	*	*
5	Stația de fond urban CJ-5 – municipiul Dej	25,25	68,09	13,58

\* La stațiile de monitorizare a calității erului CJ-2 și CJ-4 datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

Datele prezentate în tabel arată faptul că în luna august 2018 nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită orare  $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$  și nu s-a atins pragul de alertă de  $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Evoluția mediilor orare de  $\text{NO}_2$  înregistrate în luna august 2018 la stațiile de monitorizare din județul Cluj este prezentată în figura 1.2.2.1.






Figura 1.2.2.1. Evoluția mediilor orare de  $\text{NO}_2$  în luna august 2018

Din graficul prezentat se observă faptul că valoarea maximă a concentrației medii orare de dioxid de azot a fost înregistrată la stația de monitorizare CJ-1,  $144,38 \mu\text{g}/\text{m}^3$  iar valoarea minimă a mediei orare  $7,57 \mu\text{g}/\text{m}^3$  a fost înregistrată la stația de monitorizare CJ-5.

### 1.2.3. Ozon $\text{O}_3$

Ozonul este un gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros încăios. Se concentrează în stratosferă și asigură protecția împotriva radiației UV dăunătoare vieții. Ozonul prezent la nivelul solului se comportă ca o componentă a "smogului fotochimic". Se formează prin intermediul unei reacții care implică în particular oxizi de azot și compuși organici volatili.

Efecte asupra sănătății umane:

Concentrația de ozon la nivelul solului provoacă iritarea traiectului respirator și iritarea ochilor. Concentrații mari de ozon pot provoca reducerea funcției respiratorii.

Efecte asupra mediului:  
Este responsabil de daune produse vegetației prin atrofierea unor specii de arbori din zonele urbane.

Metoda de referință pentru măsurarea ozonului este cea prevăzută în standardul SR EN 14625 Calitatea aerului înconjurător, Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de ozon prin fotometrie în ultraviolet.

Rezultatele monitorizării ozonului în municipiile Cluj-Napoca și Dej în luna august 2018 sunt prezentate în tabelul 1.2.3.1:

Tabelul 1.2.3.1. Rezultatele monitorizării ozonului

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea maximă zilnică a mediei mobile pe 8 ore, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea minimă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de fond suburban CJ-3 – cartierul Grigorescu	61,50	2,03	69,35
2	Stația de fond industrial CJ-4 – str. Dâmbovitei	42,00	5,00	65,83
3	Stația de fond urban CJ-5 – municipiul Dej	99,12	20,64	107,78



Conform datelor prezentate în tabelul 1.2.3.1. valorile mediilor orare înregistrate la stațiile de monitorizare din municipiile Cluj-Napoca și Dej sunt mai mici decât pragul de informare  $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$  și pragul de alertă  $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Evoluția maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de  $\text{O}_3$  înregistrate în luna august 2018 la stațiile de monitorizare din județul Cluj este prezentată în figura 1.2.3.1.




Figura 1.2.3.1. Evoluția maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de  $\text{O}_3$ , în luna august 2018

Conform datelor prezentate în graficul 1.2.3.1, în luna august 2018 pentru ozon, nu s-au înregistrat depășiri a valorii maxime a mediei mobile pe 8 ore pentru protecția sănătății umane  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , conform Legii 104/2011.

#### 1.2.4. Monoxid de carbon CO

La temperatura mediului ambiental, monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, insipid, de origine atât naturală cât și antropică. Monoxidul de carbon se formează în principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili. Monoxidul de carbon produs din surse naturale este foarte repede dispersat pe o suprafață întinsă, nepunând în pericol sănătatea umană.

Efecte asupra sănătății umane:

Este un gaz toxic, în concentrații mari fiind letal (la concentrații de aproximativ  $100 \text{ mg}/\text{m}^3$ ) prin reducerea capacitatei de transport a oxigenului în sânge, cu consecințe asupra sistemului respirator și a sistemului cardiovascular. La concentrații relativ scăzute afectează sistemul nervos central, slăbește pulsul inimii, micșorând astfel volumul de sânge distribuit în organism, reduce acuitatea vizuală și capacitatea fizică expunerea pe o perioadă scurtă poate cauza oboseală acută, poate cauza dificultăți respiratorii și dureri în piept persoanelor cu boli cardiovasculare, determină iritabilitate, migrene, respirație rapidă, lipsă de coordonare, greață, amețeală, confuzie, reduce capacitatea de concentrare. Segmentul de populație cel mai afectat de expunerea la monoxid de carbon îl reprezintă: copiii, vârstnicii, persoanele cu boli respiratorii și cardiovasculare, persoanele anemice, fumătorii.

La concentrațiile monitorizate în mod obișnuit în atmosferă CO nu are efecte asupra plantelor, animalelor sau mediului.



Metoda de referință pentru măsurarea monoxidului de carbon este cea prevăzută în standardul SR EN 14626 Calitatea aerului înconjurător, Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de monoxid de carbon prin spectroscopie în infraroșu nedispersiv.

Rezultatele monitorizării monoxidului de carbon în județul Cluj în luna august 2018 sunt prezentate în tabelul 1.2.4.1:

Tabelul 1.2.4.1. Rezultatele monitorizării monoxidului de carbon

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea maximă zilnică a mediei mobile pe 8 ore, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea minimă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic CJ-1 – str, Aurel Vlaicu	*	*	*
2	Stația de fond suburban CJ-3 – cartierul Grigorescu	0,39	0,01	1,78
3	Stația de fond urban CJ-5 – municipiul Dej	*	*	*

\* La stațiile de monitorizare a calității erului CJ-1 și CJ-3 datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

Conform datelor prezentate în tabelul 1.2.4.1 valorile maxime zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore înregistrate la stația de monitorizare sunt mai mici decât valoarea limită pentru protecția sănătății umane de  $10 \text{ mg}/\text{m}^3$ .

Evoluția maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de CO înregistrate în luna august 2018 la stațiile de monitorizare din Județul Cluj este prezentată în figura 1.2.4.1.




Figura 1.2.4.1. Evoluția maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de CO, în luna august 2018

Din datele prezentate în grafic se observă faptul că valorile concentrației de CO înregistrate, în luna august 2018, la stația automată de monitorizare a calității aerului, sunt mult sub valoarea limită.

## 1.2.5. Pulberile în suspensie $\text{PM}_{10}$ și $\text{PM}_{2,5}$

Pulberile în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid. Acestea ajung în atmosferă din surse naturale: eruptii vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip și dispersia polenului precum și din surse antropice: activitatea industrială, sistemul de încălzire a populației, centralele termoelectrice, traficul rutier.



Metoda de referință pentru prelevarea și măsurarea concentrației de  $PM_{10}$  este cea prevăzută în standardul SR EN 12341 „Calitatea aerului, Metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracției masice de  $PM_{10}$  sau  $PM_{2,5}$  a particulelor în suspensie”.

Dimensiunea particulelor este direct legată de potențialul de a cauza efecte.

Pulberile în suspensie  $PM_{10}$  - reprezintă particulele care au diametrul aerodinamic mai mic de  $10 \mu\text{m}$ .

Datele privind monitorizarea pulberilor în suspensie fractia  $PM_{10}$ , prin metoda de referință gravimetrică, din județul Cluj în luna august 2018 sunt prezentate în tabelul 1.2.5.1:

Tabelul 1.2.5.1. Rezultatele monitorizării pulberilor în suspensie, fractia  $PM_{10}$

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic CJ-1 – str. Aurel Vlaicu	26,32	48,05
2	Stația de fond urban CJ-2 – L.T. Nicolae Bălcescu	23,43	44,06
3	Stația de fond suburban CJ-3 – cartierul Grigorescu	25,00	49,14
4	Stația de fond urban CJ-5 – municipiul Dej	17,93	38,26

Datele prezentate în tabel arată faptul că în luna august 2018 nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită zilnice de  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , la stațiile automate dotate cu echipamente pentru monitorizarea pulberilor în suspensie, fractia  $PM_{10}$ .

Evoluția mediilor zilnice de  $PM_{10}$  înregistrate în luna august 2018 la stațiile de monitorizare din Județul Cluj este prezentată în figura 1.2.5.1:




Figura 1.2.5.1. Evoluția mediilor zilnice de  $PM_{10}$ , în luna august 2018

Surse care contribuie la apariția particulelor în suspensie, sunt arderea incompletă a combustibililor în motoarele autovehiculelor, alte procese de combustie (arderi pentru încălzirea rezidențială, incinerarea deșeurilor, etc), procese industriale (prelucrarea metalelor), și săntiere, dar trebuie avute în vedere și fenomenele de transport a PM la distanță, resuspensia particulelor după utilizarea materialelor antiderapante, gradul de curățenie al drumurilor și al autovehiculelor, precum și sursele naturale.

Pulberile în suspensie  $PM_{2,5}$  – reprezintă pulberile în suspensie care trec prin un orificiu de selectare cu un randament de separare de 50% pentru un diametru aerodinamic de  $2,5 \mu\text{m}$ .



La stația de monitorizare a calității erului CJ-2 situată în incinta Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca, dotată cu echipamente necesare monitorizării pulberilor PM<sub>2,5</sub>, datele înregistrate în luna august 2018 sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

### 1.2.6. Metale toxice As, Cd, Ni și Pb

Metalele toxice provin din combustia cărbunilor, carburanților, deșeurilor menajere, etc, precum și din anumite procedee industriale. Se găsesc în general sub formă de particule. Metalele se acumulează în organism și provoacă efecte toxice de scurtă și/sau lungă durată. În cazul expunerii la concentrații ridicate ele pot afecta sistemul nervos, funcțiile renale, hepatice, respiratorii.

Metoda de referință pentru măsurarea Pb, As, Cd și Ni este cea prevăzută în standardul SR EN 14902 Calitatea aerului înconjurător, Metodă standardizată pentru determinarea Pb, Cd, As, și Ni în fracția PM10 a particulelor în suspensie.

Datorită unei defecțiuni tehnice, metalele nu au fost analizate până la această data dar există posibilitatea să fie determinate după remedierea defecțiunii.

### 1.2.7. Benzen C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>

Compus aromatic foarte ușor, volatil și solubil în apă. 90% din cantitatea de benzen din aerul ambiental provine din traficul rutier. Restul de 10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea și distribuția acestuia.

#### Efecte asupra sănătății

Substanță cancerigenă, încadrată în clasa A1 de toxicitate. Produce efecte dăunătoare asupra sistemului nervos central.

Metoda de referință pentru măsurarea benzenului este cea prevăzută în standardul SR EN 14662 Calitatea aerului înconjurător, Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de benzen, părțile 1, 2 și 3.

Stațiile automate de monitorizare a calității aerului dotate cu echipamente pentru monitorizarea benzenului sunt: CJ-1, CJ-2 și CJ-5.

Rezultatele privind monitorizarea benzenului, în județul Cluj, în luna august 2018 sunt prezentate în tabelul 1.2.7.1:

Tabelul 1.2.7.1. Rezultatele monitorizării benzenului

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic CJ-1 – str. Aurel Vlaicu	*	*
2	Stația de fond urban CJ-2 – L.T. Nicolae Bălcescu	0,82	1,29
3	Stația de fond urban CJ-5 – municipiul Dej	1,13	1,47

\* La stația de monitorizare a calității erului CJ-1 datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

Valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane pentru benzen este de 5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , potrivit legii 104/2011.



Evoluția mediilor zilnice de benzen înregistrate în luna august 2018 la stațiile automate de monitorizare a calității aerului din Județul Cluj este prezentată în figura 1.2.7.1:




Figura 1.2.7.1. Evoluția mediilor zilnice de benzen, în luna august 2018

Valoarea maximă și cea minimă, a concentrației medii zilnice de benzen, înregistrate în luna august 2018 au fost următoarele: maxima  $1,47 \mu\text{g}/\text{m}^3$  valoare înregistrată la stația de monitorizare CJ-5, respectiv minima  $0,02 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , valoare înregistrată la stația de monitorizare CJ-2.

### 1.3. Evoluția calității aerului


Evoluția indicelui general de calitate a aerului, în luna august 2018, la stațiile automate din rețeaua de monitorizare a calității aerului din județul Cluj:

Indice general de calitatea aerului zilnic					
1 EXCELENȚĂ	2 FOARTE BUN	3 BUN	4 MEDIU	5 RĂU	6 FOARTE RĂU


Indicele general de calitatea aerului este calculat pentru următorii indicatori: dioxid de sulf ( $\text{SO}_2$ ), dioxid de azot ( $\text{NO}_2$ ), ozon ( $\text{O}_3$ ), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni ( $\text{PM}_{10}$ ).

Evoluția indicelui general de calitatea aerului la stațiile din rețeaua locală de monitorizare:


Stația CJ-1 adresa: Str. Aurel Vlaicu Cluj-Napoca




Stația CJ-3 adresa: Str. 1 Decembrie 1918, Cluj-Napoca



Stația CJ-4 adresa: Str. Dâmboviței, Cluj-Napoca



Stația CJ-5 adresa: Str. 21 Decembrie, Dej



## **2. CALITATEA SOLULUI**

În luna august 2018 nu s-au prelevat probe de sol.

## **3. RADIOACTIVITATEA**

Monitorizarea radioactivității mediului se face prin supravegherea radioactivității componentelor mediului, prin măsurarea concentrației radioactive a substanțelor care „poartă” radionuclizi și care produc expunerea externă și internă a organismului: solul, aerul, apa și o mulțime de componente ale biosferei (flora și fauna). Pentru urmărirea variației în timp a concentrațiilor radioactive a substanțelor de interes pentru radioprotecție și pentru anunțarea unor creșteri semnificative, este necesar să se cunoască valorile acestor concentrații radioactive care asigură fondul natural. Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului Cluj, din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, face parte integrantă din Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității mediului.

Stația de supraveghere a Radioactivității Mediului Cluj derulează un program standard de supraveghere a radioactivității mediului de 24 ore/zi. Acest program standard de recoltări și măsurători asigură supravegherea la nivelul județului, în scopul detectării creșterilor nivelelor de radioactivitate în mediu și realizării avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Stația de Radioactivitatea Mediului Cluj efectuează în prezent măsurători de radioactivitate beta globală pentru toți factorii de mediu, calcule de concentrații ale radioizotopilor naturali Radon și Toron, cât și supravegherea dozelor gamma absorbite în aer.

Radioactivitatea factorilor de mediu, în luna august 2018, s-a situat în limitele fondului natural.

## **4. NIVEL DE ZGOMOT**

În luna august 2018 măsurarea nivelului de zgomot produs de traficul rutier s-a efectuat în 10 puncte situate în localitățile urbane din județ: municipiile: Cluj-Napoca, Gherla, Dej, Huedin, Turda și Câmpia Turzii. Monitorizarea nivelului de zgomot s-a realizat prin determinări de scurtă durată, 30 minute.

Rezultatele privind monitorizarea nivelului de zgomot, în județul Cluj, în luna august 2018 sunt prezentate în tabelul 4.1:



Tabel 4.1 Monitorizarea nivelului de zgomot

Nr.crt.	Punctul de recoltare	Valoarea minimă dB	Valoarea maximă dB	Valoarea medie dB
1	Cluj-Napoca - centru	59,8	80,6	72,9
2	Cluj-Napoca - Zorilor	60,6	84,9	73,8
3	Cluj-Napoca - Mănăștur	62,8	79,1	70,8
4	Cluj-Napoca-P-ța Mărăști	60,6	82,2	71,8
5	Cluj-Napoca - str, Oașului	58,5	83,8	73,9
6	Dej - centru	61,1	82,4	72,6
7	Gherla - centru	53,3	85,5	72,3
8	Huedin - centru	60,6	80,5	70,8
9	Câmpia-Turzii - centru	58,1	76,8	66,5
10	Turda - centru	58,4	77,7	67,4

În municipiul Cluj-Napoca nivelul de zgomot produs de traficul rutier a fost monitorizat în cinci puncte, pe străzi de categoria a II-a – de legătură care asigură circulația majoră între zonele funcționale și de locuit, având 4 benzi de circulație. Pentru această categorie de străzi nivelul de zgomot maxim admis este de 70 dB, conform STAS 10009/2018.




Figura 4.1. Rezultatele monitorizării nivelului de zgomot în Cluj-Napoca

În municipiul Cluj-Napoca s-au efectuat măsurători de 30 min, în 5 puncte de prelevare: centru (str, G, Doja), cartierul Zorilor, Cartier Mănăștur, P-ța Mărăști și str. Oașului. Valoarea maximă a nivelului mediu de zgomot s-a înregistrat în punctul de prelevare situat pe strada Oașului 73,9 dB.

Monitorizarea nivelului de zgomot în Dej, Gherla, Turda, Câmpia Turzii și Huedin s-a realizat pe străzi de categoria a III-a, având 2 benzi de circulație. Pentru această categorie de străzi nivelul de zgomot maxim admis este de 65 dB, conform STAS 10009/2018.






Figura 4.2. Rezultatele monitorizării nivelului de zgomot în județul Cluj

Valoarea maximă a nivelului mediu de zgomot s-a înregistrat în punctul de prelevare situat în municipiul Dej - centru 72,6 dB.

## 5. POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii august 2018 pe teritoriul județului Cluj nu s-au înregistrat incidente sau poluări accidentale.

## 6. SURSE DE POLUARE

(Depășiri ale concentrațiilor maxime admise)  
AUGUST 2018

### Date din monitorizarea APM Cluj


- Pulberi sedimentabile (CMA: 17g/mp/lună)
  - Dej – industrie
  - Gherla - industrie
  
- Nivel mediu de zgomot (CMA: 70 dB)
  - Probe de scurtă durată (30 min):
    - Cluj-Napoca - Centru
      - cartier Zorilor
      - cartier Mănăstur
      - cartier Mărăști
      - strada Oașului
  
- Nivel mediu de zgomot (CMA: 65 dB)
  - Huedin - centru
  - Turda – centru



- Câmpia-Turzii - centru
- Dej – centru
- Gherla - centru

În județul Cluj traficul rutier este principala sursă de poluare din punct de vedere fonic.

ŞEF SERVICIU MONITORIZARE ŞI LABORATOARE  
p. Dr. Ing. Marinela SIMIHĂIAN



Întocmit  
Ing. Simona CIUHUȚĂ

